

## FOGLIO ILLUSTRATIVO

### PRIMA DELL'USO

#### LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

### LACRILUBE 42,5% paraffina liquida + 57,3% vaselina bianca unguento oftalmico

#### COMPOSIZIONE

100 g contengono:

Principi attivi: Paraffina liquida, Vaseline bianca

Eccipienti: Lanolina alcool

#### COME SI PRESENTA

Lacrilube si presenta in forma di un unguento omogeneo e liscio, di colore bianco.

Ogni tubo contiene 3,5 g di unguento oftalmico.

#### CHE COSA È

Lubrificante oculare.

#### TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 snc

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Italia

#### PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

TUBILUX PHARMA S.p.A

Via Costarica, 20/22

Pomezia (Roma)

#### PERCHÉ SI USA

Lacrilube si usa per lubrificare e proteggere gli occhi in presenza di stati di secchezza oculare.

#### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso gli alcol della lanolina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

#### Quando può essere usato dopo aver consultato il medico

Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

#### Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Lacrilube contiene ingredienti che sono stati utilizzati da anni in altri medicinali senza effetti preoccupanti in gravidanza o allattamento. Pertanto, nessuna speciale precauzione è necessaria per l'utilizzo di Lacrilube in queste condizioni.

## **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Il medicinale può causare offuscamento della vista e temporanei disturbi visivi in alcuni pazienti. Non guidate e non usate macchinari fino a quando i sintomi non sono scomparsi.

## **PRECAUZIONI PER L'USO**

Poichè Lacrilube è una preparazione sterile, evitare che la punta del tubo venga a contatto con qualsiasi superficie.

## **QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Non sono state osservate interazioni con altri medicamenti.

Se state usando altri medicinali (anche quelli senza prescrizione medica) chiedete consiglio al vostro medico o farmacista. Se state utilizzando (o avete intenzione di usare) altre medicazioni per trattare una condizione oculare, allora dovete prima applicare l'altra medicazione e poi aspettare almeno 5 minuti prima di usare Lacrilube.

## **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Il medicinale deve essere tenuto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Se portate lenti a contatto, queste devono essere rimosse prima dell'utilizzo del prodotto. Le lenti possono essere nuovamente indossate dopo 30 minuti dall'applicazione dell'unguento.

## **Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Lacrilube**

Lacrilube contiene lanolina alcol che può causare reazioni locali (es. dermatite da contatto).

## **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

Usare Lacrilube seguendo esattamente le istruzioni contenute in questo foglio illustrativo. In caso di dubbio contattare il medico o il farmacista.

### **Quanto**

Appicare una piccola quantità di Lacrilube nell'occhio una o più volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.

Il sovradosaggio accidentale (negli occhi) non rappresenta un pericolo, a parte l'offuscamento della vista per breve tempo. Se Lacrilube è deglutito per errore, contattate il medico o il farmacista. Non applicare dosi doppie di prodotto se è stata dimenticata l'applicazione di una dose individuale. Applicare direttamente la dose successiva nel momento necessario come consigliato dal medico o dal farmacista.

### **Quando e per quanto tempo**

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Questo prodotto non deve essere usato per un periodo superiore a 72 ore.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

In caso di comparsa o peggioramento di irritazione, dolore, rossore o cambiamenti della visione, interrompete il trattamento con Lacrilube e consultate il medico o il farmacista.

### **Come**

- Lavare le mani
- Abbassare la palpebra inferiore in modo da formare una piccola sacca in cui applicare il prodotto
- Tenere leggermente la testa indietro
- Tenere il tubo del prodotto tra pollice ed indice ed applicarne una piccola quantità nella sacca precedentemente formata
- Chiudere gli occhi, ruotandoli da destra a sinistra e viceversa per favorire la distribuzione del prodotto.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, Lacrilube può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dopo applicazione di Lacrilube, si possono verificare i seguenti effetti indesiderati, ma la frequenza non è nota:

- Irritazione oculare
- Rossore oculare
- Dolore oculare
- Offuscamento della vista
- Allergia oculare
- Gonfiore e prurito dell'occhio e/o della palpebra
- Escrezione oculare
- Sensazione di corpo estraneo nell'occhio
- Eccesso di lacrimazione

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale

#### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

**Dopo la prima apertura la validità è di 28 giorni.**

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale. Pertanto, conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 10/2022**